

# DulcoSoft®

## Ballonnements



Granules à dissolution rapide à base de Siméticone

SANOFI

Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation car elles contiennent des informations importantes que vous devez connaître avant d'utiliser ce produit. Si vous avez des doutes ou si vous avez d'autres questions, veuillez-vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.

DULCOSOFT® Ballonnements est un dispositif médical qui procure un soulagement rapide des problèmes gastro-intestinaux provoqués par un excès de gaz.  
Conservez cette notice. Vous aurez peut-être besoin de la relire.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que DULCOSOFT® Ballonnements et dans quel(s) cas est-il utilisé
2. Avant de prendre DULCOSOFT® Ballonnements
3. Comment prendre DULCOSOFT® Ballonnements
4. Les effets secondaires indésirables éventuels
5. Comment conserver DULCOSOFT® Ballonnements
6. Autres informations

### 1. Qu'est-ce que DULCOSOFT® Ballonnements et dans quel(s) cas est-il utilisé

Le composant principal de DULCOSOFT® Ballonnements est la siméticone, un agent antimaïseuse qui disperse les gaz piégés dans l'estomac et les intestins. DULCOSOFT® Ballonnements est utilisé :

- Pour le soulagement d'un excès de gaz dans le tractus gastro-intestinal.
- Pour le soulagement et le traitement symptomatique des gênes gastro-intestinales telles que des éructations, ballonnements et flatulences (pets), gonflement ou pesanteur abdominale, sensation de satiété précoce ;
- En préparation d'un examen diagnostique dans la région abdominale, par ex. examen par endoscopie, rayons X et ultrasons.

### 2. Avant de prendre DULCOSOFT® Ballonnements

Ne prenez pas DULCOSOFT® Ballonnements si vous êtes allergique (hypersensible) à la siméticone ou à n'importe lequel des autres composants de DULCOSOFT® Ballonnements.

Ce produit contient du sorbitol. Les patients souffrant de problèmes hépatocœliaires tels qu'un diabète ou une fructose ne doivent pas prendre ce dispositif médical. Ce produit contient de l'arôme de menthe poivrée. Son inhalation peut entraîner une dyspnée ou une crise d'asthme.

Si vous avez des problèmes d'eczéma persistants ou inépliqués, informez-en votre médecin.

#### Grossesse et allaitement

DULCOSOFT® Ballonnements peut être pris pendant la grossesse ou l'allaitement car il traverse l'ovocaire sans modification et n'est pas absorbé par l'organisme. Néanmoins, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, il est conseillé d'interroger votre médecin avant d'utiliser DULCOSOFT® Ballonnements.

#### Utilisation chez les enfants

Ce produit ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans.

#### Utilisation chez les diabétiques

DULCOSOFT® Ballonnements convient aux diabétiques. Les granules ne contiennent pas de sucre. Chaque sachet contient 1 g de glucides assimilables, soit 2,6 kcal.

#### Prise de DULCOSOFT® Ballonnements avec d'autres produits

Aucune interaction connue.

### 3. Comment prendre DULCOSOFT® Ballonnements

Prenez toujours DULCOSOFT® Ballonnements exactement de la façon décrite dans ces instructions d'utilisation.

Veuillez auprès de votre médecin ou pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

- DULCOSOFT® Ballonnements doit être pris au moment des repas ou après, et, si nécessaire, avant d'aller se coucher.
- DULCOSOFT® Ballonnements peut être pris sans eau. Mettez les granules sur votre langue, laissez-les dissoudre dans la salive et sont ensuite avalés. Si vous le souhaitez, vous pouvez boire de l'eau après.
- DULCOSOFT® Ballonnements est un produit destiné à un traitement de courte durée et ne doit pas être pris pendant plus de 30 jours sans l'avis de votre médecin.

Dose recommandée (sauf prescription contraire de votre médecin) :

Âge	Dose unitaire	Dose quotidienne totale
Enfants âgés de 6 à 14 ans	1 sachet (correspondant à 125 mg de siméticone)	3 sachets (correspondant à 375 mg de siméticone)
Adultes et adolescents à partir de 14 ans	1-2 sachets (correspondant à 125 – 250 mg de siméticone)	6 sachets (correspondant à 750 mg de siméticone)

Vous devrez peut-être prendre DULCOSOFT® Ballonnements en préparation à des examens diagnostiques des régions abdominales.

Dose recommandée (sauf prescription contraire de votre médecin) :

Âge	Le jour précédant l'examen	Le jour de l'examen
Adultes et enfants à partir de 6 ans	3-3 sachets (correspondant à 250 – 375 mg de siméticone)	1 sachet (correspondant à 125 mg de siméticone)

Si vous prenez plus que la dose recommandée la siméticone exerce un effet purgatif physique dans le tractus gastro-intestinal. Si des quantités plus importantes que celles recommandées sont prises, la siméticone est habituellement tolérée sans difficulté.

### Si vous oubliez de prendre DULCOSOFT® Ballonnements

Ne prenez pas une dose double de DULCOSOFT® Ballonnements si vous avez oublié de prendre la dose précédente.

### 4. Les effets indésirables éventuels

Aucun effet indésirable dû à la prise de DULCOSOFT® Ballonnements n'est connu à ce jour. Si vous ressentez des effets indésirables, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. Comment conserver DULCOSOFT® Ballonnements

Gardez les dispositifs médicaux hors de portée des enfants.

N'utilisez pas DULCOSOFT® Ballonnements après la date d'expiration.

### 6. Autres informations

DULCOSOFT® Ballonnements est disponible en boîte de 18 sachets. Chaque sachet contient 125 mg de siméticone.

#### Autres composants :

Sorbitol, dioxyde de silicium, carboxyméthylcellulose de sodium et arôme de menthe poivrée.

CE 0482

#### Fabricant :

HALSA Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Straße 5  
D-23562 Lübeck – Allemagne

#### Distribué par :

Opvia Healthcare France  
82, avenue Raspail  
94250 Courbevoie – France

#### Information Patients :

0 801 907 577 service clients

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2021/V.1.



CONSIGNE POUR VANT VARIET LOCALEMENT  
➔ WWW.CONSIGNESECTEUR.FR  
VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE